

TC TOTAL BODY CON E SENZA MDC

L'esame TC del cranio, del torace, dell'addome e della pelvi, eseguito con tecnica spirale multislice, prima e dopo iniezione di contrasto per venam, confrontato con il precedente esame del 20.01.2012, ha mostrato:

In ambito cerebrale: Assenza di aree di alterata densità cerebrale. Ventricoli laterali in sede, non dilatati nè deformati. 3° e 4° ventricolo sulla linea mediana. Normale ampiezza per età degli spazi subaracnoidei della volta e della base.

Al torace: Significativa riduzione di numero e dimensioni delle formazioni nodulari, di verosimile natura ripetitiva, a carico del parenchima polmonare di sinistra. Al segmento apicale del lobo inferiore omolaterale si apprezza sfumato addensamento parenchimale, non apprezzabile al precedente esame, con aree pseudonodulari nel suo contesto, la maggiore di circa 12mm.

A destra sostanzialmente immutate le millimetriche formazioni nodulari al lobo medio.

Multiple bolle di enfisema centrolobulare, più evidente ai lobi superiori di ambo i lati.

Assenza di significative linfoadenopatie mediastiniche. Lipoma della parete toracica laterale destra di 40x12mm, immutato rispetto al precedente esame.

In addome: Fegato di volume regolare, a densità finemente disomogenea, ma senza evidenza di lesioni focali a significato patologico. Si confermano le multiple formazioni ipodense, di natura cistica, immutate rispetto al precedente esame, la maggiore al VI segmento di 41mm.

Asse spleno-portale pervio, non ectasico.

Vie biliari intra- ed extraepatiche non dilatate.

Pancreas a struttura disomogenea per la presenza di minute calcificazione ed alcune formazioni ipodense (pseudocisti), localizzate a livello della testa (la maggiore di 14mm) ed a livello della giunzione corpo-coda, da esiti flogistici.

Milza e surreni nei limiti.

Reni in sede, disomorfico il sinistro per retrazione della corticale a sede mesorenale (esiti nefritici? esiti chirurgici?), di forma e volume regolare il controlaterale, con conservata funzionalità escretoria in assenza di ectasia delle vie escrettrici. Presenza di diverse formazioni cistiche d'ambo i lati, la maggiore a sinistra di 32mm, immutata rispetto al precedente esame.

Arteria renale accessoria a sede ilare sinistra. Vena renale sinistra accessoria a decorso

Caserta, 16/04/2012

retroaortico. Linfonodo ovalare, di 27x9mm, a sede paraortica di sinistra, di verosimile natura reattiva.

Iniziale dilatazione aneurismatica dell'aorta sottorenale distale, di 26x24mm (18.5x18mm a monte) con apposizione trombotica laterale destra e posteriore di 7.5mm di spessore massimo.

Vescica parzialmente distesa, a pareti non ispessite.

Prostata in sede, di dimensioni aumentate, a densità disomogenea.

Non evidenza di significative linfadenopatie intercavoparaortiche, retrocrurali, mesenteriali, iliache, otturatorie ed inguinali.